

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO

ÁREA DE ECOTOMOGRAFÍA

Paciente: LIVIO NATERO CASACCIA

Edad: 00 AÑOS

RUT: 15.098.274-K

Solicitante: DR. DANILO JARA

Fecha de examen: 17/03/2026

Examen: ECOTOMOGRAFÍA TESTICULAR

INFORME:

Ambos testículos se localizan en las cavidades correspondientes del saco escrotal.

Miden 49 mm a derecha y 48 mm a izquierda.

Escasos focos aislados de microlitiasis testicular bilateral.

Quiste del epidídimo izquierdo, de 5 mm.

El estudio con Doppler-color evidencia conservación de los flujos sanguíneos intratesticulares y en los epidídimos.

Escaso hidrocele bilateral.

Dilatación del plexo venoso peritesticular izquierdo, calibre de hasta 3,2 mm. Se observa reflujo con maniobra de Valsalva.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Escasos focos aislados de microlitiasis bilateral.

Quiste del epidídimo izquierdo.

Varicocele izquierdo.

Escaso hidrocele bilateral.



Dra. María Alejandra Guillón García.

Especialista en Radiología e Imagenología.