

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO UROLÓGICO

ÁREA DE ECOTOMOGRAFÍA

Paciente: MAX CONTRERAS AGUILERA

Edad: 50 AÑOS

RUT: 12.954.719-7

Solicitante: DR. FELIPE BEASAIN CHANDÍA.

Fecha de examen: 13/02/2026

Examen: ECOTOMOGRAFÍA TESTICULAR.

INFORME:

Testículos en el escroto.

El testículo derecho presenta volumen de 12.6cm^3 y el izquierdo de 12.8cm^3 (Lambert), con estructura y patrón vascular normales. El índice de resistencia testicular derecho corresponde a 0.65 y el izquierdo a 0.63. No se reconoce nódulos.

Moderada cantidad de imágenes quísticas periféricas al testículo y al epidídimo izquierdos, con aspecto simple, la mayor en área craneal del hemiescroto, de 25mm y que determina desplazamiento de la cabeza epididimaria hacia anterior.

Epidídimos con estructura y tamaño normales, destacando imagen quística en cabeza epididimaria derecha, de 5mm y con aspecto simple.

Escrotolito izquierdo de 3mm.


Con el paciente en reposo, de pie y con maniobras de Valsalva se evalúa ambos plexos pampiniformes, observando en cordón espermático derecho escasos varicoceles con calibre de 3mm.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:

Moderada cantidad de imágenes quísticas en hemiescroto izquierdo, la mayor desplazando parcialmente la cabeza epididimaria. En su etiología debe incluirse mesotelioma quístico benigno.

Imagen quística epididimaria derecha, con aspecto simple.

Escasos y leves varicoceles en cordón espermático derecho.



Atentamente:

Dr. Oscar Solari Pereira

Médico Radiólogo